



MARIPOSAS

En nuestros campos vuelan alrededor de 4.000 especies de mariposas, a las que podemos clasificar en dos grupos: los ropalóceros o mariposas diurnas y los heteróceros o mariposas nocturnas. Estos insectos succionan el néctar de las flores con una especie de trompa, y las orugas o larvas de algunas especies pueden causar daños importantes a las plantas. Te presentamos algunas curiosidades de las mariposas diurnas.

PROCESO

Las mariposas, también conocidas como lepidópteros, son insectos con metamorfosis completa que tiene 4 estadios:



Huevo:

Es la "fase embrionaria del insecto". Su forma y color son variables.



Larva u oruga:

Es la "fase de crecimiento", durante la que el insecto se alimenta y acumula sustancias de reserva, al tiempo que aumenta de tamaño.



Pupa, ninfa o crisálida:

Es la "fase de transformación" del insecto, en la que los tejidos de la oruga son destruidos parcialmente, para luego ser reconstruidos y formar el adulto.



Adulto o imago:

Es la "fase de reproducción" del insecto y es la mariposa adulta, teniendo los sexos separados, a menudo morfológicamente diferentes (diformismo sexual) de forma más o menos acentuada.



EURODYAS AURINIA

Habita en todo tipo de zonas húmedas con vegetación. Aparece a partir de mayo-junio en dos generaciones anuales.



COLIAS CROCEA

Se la llama "colias común". Aparece a partir de abril-mayo, en varias generaciones anuales hasta entrado el otoño.



LISANDRA BELLARGUS

La hembra es de color pardo oscuro. Vuelan hasta octubre en dos generaciones anuales en áreas herbosas algo húmedas y en zonas de escasa vegetación.



PAPILO MACHAON

Vuelan en abril, mayo y septiembre. Se la conoce como la "dos colas".



ZERINTHIA RUMINA

Su hábitat preferido son las zonas agrestes y las pendientes rocosas. Tienen una sola generación anual a partir de marzo-abril.



IPHECLIDES PODALIRIUS

Vuelan en abril-mayo la primera generación anual y en julio-agosto la segunda. Se la llama vulgarmente "chupaleche".



PARNASSIUS APOLLO

Aparece en zonas montañosas entre los meses de julio y agosto. Su cuerpo es peludo y en sus alas aparecen lunares negros en ambos sexos y además rojos en la hembra.



CHARAKES JASTUS

Vulgarmente llamada "cuatro colas". Aparecen dos generaciones anuales en los meses de abril-mayo.



INACHIS IO

Alias "pavo real". Sus alas son de color teja en el reverso. Vuelan en junio por debajo de los 2.500 metros de altitud.

